

2020 DATE DEL PRIMO DEI DUE TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI

CONTRO S.TITANUS. CICALINA VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA



zone	siti	comune	DATE PRIMO TRATTAMENTO		SECONDO TRATTAMENTO.			OBLIGATORIO	
			PRODOTTI UTILIZZABILI (gruppo)		PRODOTTI UTILIZZABILI				
			A	B	A	B	C		
FOCOLAI	PRECOCI	BARENGO BOGOGNO BORGOMANERO BRIONA CRESSA FARA NO.SE MARANO T.NO MEZZOMERICO SUNO SIZZANO	acetamiprid (neonicotinoidi)	Flupyradifurone	OBLIGATORIO	PIRETROIDI acrinatrina tau-fluvalinate	clorpirifos metile (fosfororganici)	etofenprox (Fenossibenil eteri)	OBLIGATORIO
	TARDIVI	BOCA CAVAGLIO D'AG CAVALLIRIO GHEMME GRIGNASCO ROMAGNANO S.							
NELLE ZONE DI INSEDIAMENTO (LANDIONA E CARPIGNA)			VIGE LO STESSO OBBLIGO DI EFFETTUARE DUE TRATTAMENTI SEGUENDO LE INDICAZIONI DATE/PRODOTTI DEI SITI PRECOCI						

IN TUTTI GLI ALTRI COMUNI DEL NOVARESE (p.es MAGGIORA E OVE SIA PRESENTE VITE DA VINO/TAVOLA (ZONE INDENNI PARTICOLARMENTE A RISCHIO) O OVE VIGE COMUNQUE L'OBBLIGO DI UN SOLO (UNICO) TRATTAMENTO INSETTICIDA ESSO VA POSIZIONATO 10 GIORNI DOPO LA DATA CONSIGLIATA PER IL 1° TRATTAMENTO PER ESEMPIO: ACETAMIPRIDINTORNO AL 15 LUGLIO

NOTE PRATICHE AGGIUNTIVE TRATTARE CON VOLUMI D'ACQUA ALTI (ALMENO 500 L/HA) . **ACIDIFICARE** PORTANDO IL pH verso 6.0(p.es con Aceto a 0,5 l/hl)

VERIFICARE SEMPRE NEI 2 TRATT.TI ALTERNARE PA INSETTICIDI DI GRUPPI DIVERSI(A/B/C).

LIMITAZIONI USO IN ETICHETTA

I TRATTAMENTI SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI con le date indicate A SECONDA DEL COMUNE ANCHE SU UVA AMERICANA

E SU QUALSIASI PIANTA DI VITE ANCHE SINGOLA IN ORTI, CORTILI, GIARDINI, PERGOLATI. SPESSO SONO QUELLE PIÙ COLPITE!! DIFFONDERE L'INFO

SU ISABELLA O ALTRI IBRIDI/ DIFESA BIOLOGICA POSSIBILE UTILIZZARE AZADIRACTINA CON PARZIALE EFFETTO ABBATTENTE/REPELLENTE SU POPILLIA

ZONE/VIGNETI CON PRESENZA DI POPILLIA JAPONICA: VEDERE TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL

BOLLETTINO SPECIFICO 9 BIS DEL 26.06. IN CASO DI PRESENZA POSSIBILE ANTICIPARE DI QUALCHE GIORNO IL POSIZIONAMENTO DELL'INTERVENTO

IL PRODOTTO PIÙ CONSIGLIATO SE NECESSARIO TRATTARE PER FORTE INFESTAZIONE È ACETAMIPRID

PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI (LEGGE REG. N.20 DEL 3/8/98)

SI RAMMENTA: DIVIETO TRATTAMENTI IN FIORITURA. **OBBLIGO SFALCIO PRELIMINARE FIORITURE SPONTANEE NEL VIGNETO. EVITARE DERIVA DOPO IL TRATTAMENTO TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO(ALMENO 48 H) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON I SINTOMI. QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DEL FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO)**

O IN SITI PRECOCI